－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

２０１１年１０月

製造販売元
日本薬品工業株式会社
東京都千代田区岩本町2丁目2-3

アリルアミン系経口抗真菌剤

テルビナール®錠125mg
Terbinal®

テルビナフィン塩酸塩製剤

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、標記製品の「**使用上の注意**」の記載内容を下記のとおり改訂致しましたので、ご案内申し上げます。

つきましては、ここにあります内容に充分ご留意頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

＜改訂内容（2011年10月改訂）＞

改訂後

【使用上の注意】

３．相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
シメチジン フルコナゾール	本剤の血中濃度が上昇するとの報告があるので、併用する場合には用量に注意すること。	これらの薬剤によるチトクロムP-450の抑制により本剤の代謝が遅延する。

現行通り

４．副作用

（2）その他の副作用

	頻度不明
過敏症注)	発疹、蕁麻疹、そう痒感、紅斑、光線過敏性反応、顔面浮腫、リンパ節腫脹、多形紅斑、乾癬様発疹、血清病様反応
感覚器	味覚異常・味覚消失、耳鳴、嗅覚異常、聴覚障害、聴力低下
その他	トリグリセライド上昇、総コレステロール上昇、疲労・倦怠感、動悸、浮腫、月経異常、脱毛、発熱、CK（CPK）上昇、乾癬、血管炎、インフルエンザ様疾患

注）投与を中止し、適切な処置を行うこと。

改訂前

【使用上の注意】

３．相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
シメチジン	本剤の血中濃度が上昇するとの報告があるので、併用する場合には用量に注意すること。	シメチジンによるチトクロムP-450の抑制により本剤の代謝が遅延する。

省略

４．副作用

（2）その他の副作用

	頻度不明
過敏症注)	発疹、蕁麻疹、そう痒感、紅斑、光線過敏性皮膚炎、顔面浮腫、リンパ節腫脹、多形紅斑、乾癬様発疹、血清病様反応
感覚器	項目なし
その他	トリグリセライド上昇、総コレステロール上昇、疲労・倦怠感、味覚異常・味覚消失、動悸、浮腫、月経異常、耳鳴、脱毛、発熱、CK（CPK）上昇、乾癬、血管炎、インフルエンザ様疾患、嗅覚異常

注）投与を中止し、適切な処置を行うこと。

※＿＿＿：改訂箇所　　‥‥‥：項目移動箇所　　※DSU　No.204（2011年11月）に掲載予定

以上