



## 新発売のご案内

謹啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、下記品目を **2020年3月3日** に発売致しますので、ご案内申し上げます。

今後とも、他の製品同様倍旧のご愛顧の程お願い申し上げます。

謹白

記

(規制区分)/製品名	有効成分	日本標準商品分類番号	使用期限/貯法	製造販売元	販売元 (2020年1月時点)
(処方箋医薬品) 経皮吸収型・気管支拡張剤 日本薬局方 ツロブテロール経皮吸収型テープ ツロブテロールテープ 0.5mg「YP」 ツロブテロールテープ 1mg「YP」 ツロブテロールテープ 2mg「YP」	1枚中(日局) ツロブテロール 0.5mg ツロブテロール 1mg ツロブテロール 2mg	872259	2年 (外箱、内袋に表示) /室温保存	祐徳薬品工業株式会社	祐徳薬品工業株式会社 日本ケミファ株式会社
(処方箋医薬品) HMG-CoA 還元酵素阻害剤 日本薬局方 ピタバスタチンカルシウム錠 ピタバスタチン Ca 錠 1mg「ケミファ」 ピタバスタチン Ca 錠 2mg「ケミファ」	1錠中(日局) ピタバスタチンカルシウム水和物 1.1mg (ピタバスタチンカルシウムとして 1mg) ピタバスタチンカルシウム水和物 2.2mg (ピタバスタチンカルシウムとして 2mg)	872189	外装に表示(3年) /遮光、気密容器 (室温保存)	日本ケミファ株式会社	日本ケミファ株式会社

### 《流通コード(メーカーコード 440)》

製品名	包装規格	統一商品コード	JANコード	GS1 (販売包装単位)	GS1 (調剤包装単位)
ツロブテロールテープ 0.5mg「YP」	70枚 (1枚/袋×70袋)	440212704	4987440212704	(01)14987440212701	(01)04987440212742
ツロブテロールテープ 1mg「YP」	70枚 (1枚/袋×70袋)	440213701	4987440213701	(01)14987440213708	(01)04987440213749
ツロブテロールテープ 2mg「YP」	70枚 (1枚/袋×70袋)	440214708	4987440214708	(01)14987440214705	(01)04987440214746
ピタバスタチン Ca 錠 1mg「ケミファ」	PTP100錠 (10錠×10)	440648015	4987440648015	(01)14987440648012	(01)04987171779019
ピタバスタチン Ca 錠 2mg「ケミファ」	PTP100錠 (10錠×10)	440640019	4987440640019	(01)14987440640016	(01)04987171780008

次ページ以降もご覧ください

《包装・元梱サイズ等》



製品名	包装規格	包装単位のサイズ	包装単位の重量 (g)	元梱単位 (入数)	元梱単位のサイズ	元梱単位の重量 (kg)
		縦×横×高さ (mm)			縦×横×高さ (mm)	
ツロブテロールテープ 0.5mg「YP」	70 枚 (1 枚/袋×70 袋)	33×76×57	49	50	184×306×166	2.7
ツロブテロールテープ 1mg「YP」	70 枚 (1 枚/袋×70 袋)		52			2.8
ツロブテロールテープ 2mg「YP」	70 枚 (1 枚/袋×70 袋)		65			3.4
ピタバスタチン Ca 錠 1mg「ケミファ」	PTP100 錠 (10 錠×10)	55×123×47	53	100	496×272×301	5.5
ピタバスタチン Ca 錠 2mg「ケミファ」	PTP100 錠 (10 錠×10)		58			5.9

※包装・元梱単位のサイズ・重量は一部推定値であり、実測値と異なることがあります。

《薬価基準》及び《包装薬価》

製品名	包装規格	薬価基準記載医薬品コード	レセプト電算処理システムコード	薬価 (円)	包装薬価 (円)
ツロブテロールテープ 0.5mg「YP」	70 枚 (1 枚/袋×70 袋)	2259707S1187	621762601	21.00	1,470
ツロブテロールテープ 1mg「YP」	70 枚 (1 枚/袋×70 袋)	2259707S2183	621762701	29.70	2,079
ツロブテロールテープ 2mg「YP」	70 枚 (1 枚/袋×70 袋)	2259707S3180	621762801	38.30	2,681
ピタバスタチン Ca 錠 1mg「ケミファ」	PTP100 錠 (10 錠×10)	2189016F1125	622297101	16.30	1,630
ピタバスタチン Ca 錠 2mg「ケミファ」	PTP100 錠 (10 錠×10)	2189016F2121	622297201	30.70	3,070

【ツロブテロールテープ 0.5mg/1mg/2mg「YP」 製剤・内袋・個装箱写真等】

	ツロブテロールテープ 0.5mg「YP」		ツロブテロールテープ 1mg「YP」		ツロブテロールテープ 2mg「YP」	
	テープ本体	剥離シール側	テープ本体	剥離シール側	テープ本体	剥離シール側
製剤 (写真)						

※製剤は日本ケミファ株式会社と共通です。

	ツロブテロールテープ 0.5mg「YP」	ツロブテロールテープ 1mg「YP」	ツロブテロールテープ 2mg「YP」
内袋 (イメージ図)			
サイズ(縦×横)	46mm×48mm		52mm×54mm
例:2mg 個装箱 (写真)			

※内袋のデザインは日本ケミファ株式会社と異なります。

※内袋の裏面に製造番号・使用期限を記載しております。

※個装箱は日本ケミファ株式会社のデザインを一部変更した仕様となります。

＜変更点＞

- (1)販売元の表示
- (2)開封口の形状(半円形→台形)及びデザイン
- (3)短側面の表示入替
- (4)蓋面のデザイン

※患者さん用指導箋を個装箱に封入しております(日本ケミファ株式会社と共通)。

0.5mg・1mg・2mg 70枚包装:10枚綴り1冊

患者さん用指導箋(縦148mm×横105mm)

**ツロブテロールテープ「YP」の貼り方**

- ①  切り口が2箇所あります。両方とも切って、テープを取り出してください。  
※0.5mg, 1mg, 2mgのいずれも使い方は同じです。
- ②  「フィルム」と表示された面を上にして、山折りにしてください。
- ③  片方のフィルムを半分ほど浮かせ、浮いたフィルムをつまみ、はがしてください。この時、テープを左右に強くひっぱらないよう注意してください。また、粘着面に指がふれないよう注意してください。
- ④  もう片方のフィルム面を持ってテープを貼り、軽く押さえ、フィルムをずらしながら、残りのテープを貼ってください。この時、テープがカールするおそれがありますので、フィルムをあまり強くひっぱらないでください。
- ⑤  貼ったあとは、手のひらで全体をしっかりと押さえてください。

**保管上の注意**

☆使用する前までは、袋を開かず、高温を避けて保管してください。  
☆子供の手の届かないところに保管してください。

(表)

**ツロブテロールテープ「YP」を使用されている方へ**

**使用方法の注意**

このテープは、あなたの症状に合わせて処方されたお薬です。主治医又は薬剤師の指示に従って正しく使用してください。  
※このテープを家族や他の人にあげてはいけません。

**貼る回数**  
このテープは1日1回、必ず貼りかえてください。

**貼る部位**  
☆このテープは、胸、上腕、背中の中のいずれか1箇所に貼ってください。

  
胸

  
上腕

  
背中

☆貼る部位は乾いたタオル等でよく拭き、清潔にして使用してください。  
☆このテープをはがしてしまう可能性のある子供には、手の届かないところに貼ってください。  
☆傷口や湿疹のある部位には貼らないでください。  
☆汗をかきやすい部位や、クリーム、軟膏等をぬった部位は、はがれやすくなるので貼らないでください。  
☆同じところに続けて貼ると、かゆくなったり、かぶれたりすることがありますので、新しいテープに貼りかえる時は、同じところを避けて貼ってください。

**貼る時に注意すること**

☆テープからフィルムをはがす時、強くひっぱらないでください。強すぎると破れたり、カールしたりするおそれがあります。  
☆粘着面に指がふれると粘着力が低下して、うまく貼れないことがあります。  
☆テープは一度はがしたら、再び貼り直すことができません。  
☆テープが少しはがれた場合は、刺激の少ない絆創膏等で固定してください。  
※このテープを使って、何か変だと感じたときは、主治医又は薬剤師に相談してください。

S-2439

(裏)

【ピタバスタチン Ca 錠 1mg/2mg「ケミファ」 錠剤・PTPシート・個装箱写真等】

	ピタバスタチン Ca 錠 1mg「ケミファ」			ピタバスタチン Ca 錠 2mg「ケミファ」		
	表	裏	側面	表	裏	側面
錠剤 (写真)						
	表	裏	表	裏		
PTP 10錠シート (写真)						
サイズ(縦×横)	99mm×40mm					
例:2mg 個装箱 (写真)						

※錠剤、PTPシートは日本ケミファ株式会社と共通です。

※個装箱は日本ケミファ株式会社のデザインを一部変更した仕様となります。

＜変更点＞

- (1)販売元の表示
- (2)タグサイズ：縦 33mm×横 85mm→縦 33mm×横 73mm
- (3)タグ形状：切り取り後に穴が空かないタイプ→切り取り後に穴が空くタイプ

※患者さん用指導箋を個装箱に封入しております（日本ケミファ株式会社と共通）。

1mg・2mg PTP10錠包装：10枚綴り1冊

患者さん用指導箋（右図）  
（縦 85mm×横 35mm）

**ピタバスタチンCa錠**  
「ケミファ」を服用される  
患者様へ

本剤は、血液中のコレステロールを減らすお薬です。このお薬は、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」が起ることが知られています。次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性があるので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。

- 筋肉が痛い
- 手足の力が入らない
- 尿の色が濃い（赤褐色になる）

副作用はどんなお薬よりもありませんが、早期に発見し、適切な処置をおこなえば大事に至ることはほとんどありません。また、他にもお薬を服用して体調がおかしいと感じたら、先生にご相談ください。

\*「横紋筋融解症」とは、筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分（ミオグロビン）が血液中に流れ出る病気で、赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎障害（腎臓の機能が低下し尿がでにくくなる）になることもあります。

製造販売元  
日本ケミファ株式会社

（表）

（裏）

以上